

ZANZARA TIGRE E COREANA


COME CONTRASTARNE LA DIFFUSIONE IN AMBIENTE URBANO



GENERE E SPECIE



zanzara comune (*Culex pipiens*)



zanzara tigre (*Aedes albopictus*),
diurna, sopravvivenza delle uova
anche per diversi mesi, ciclo di
sviluppo 10-15 giorni (a seconda
delle temperature)



zanzara coreana (*Aedes koreicus*),
comparsa in trentino nel 2011,
rispetto alla zanzara tigre resiste a
temperature più basse; gli adulti
compaiono più precocemente e
persistono anche fino all'autunno
inoltrato, potendo colonizzare zone
sopra gli 800 m.

PERIODI DI PROLIFERAZIONE:

Estate

TIPOLOGIA DI INTERVENTO:

Trattamenti larvicidi (preferibili alle nebulizzazioni di prodotti adulticidi che sono tossici per l'ambiente) nell'ottica del contrasto alla proliferazione della zanzara tigre e prevenzione all'insediamento della zanzara coreana.

METODO:

il Comune interviene a cadenza mensile inserendo nei tombini (pubblici) un prodotto biologico autorizzato (*Bacillus thuringiensis* var. *israelensis* + *Bacillus sphaericus*)

ATTENZIONE: SOPRAVVIVENZA DELLE LARVE NELL'ACQUA CON TEMPERATURA INFERIORE AI 5°C

E' IMPORTANTE LA COLLABORAZIONE DI TUTTI I CITTADINI E DELLE AZIENDE!

Impedire i ristagni di acqua e contrastare la deposizione delle uova
e il completamento del ciclo biologico delle zanzare.

RIEPILOGO:



Sul balcone e al cimitero

Eliminare i sottovasi, oppure riempirli di ghiaia o sabbia o svuotarli almeno una volta alla settimana (non nei tombini!).



Nei giardini e piazzali

Svuotare regolarmente, capovolgere o coprire tutti i contenitori che possono far ristagnare l'acqua.



Negli orti e giardini

Coprire con teli, coperchi o zanzariere i bidoni e le vasche. Distendere bene i teli di copertura per evitare ristagni.



Vasche e tombini

Trattare i depositi di acqua all'aperto tramite larvicidi biologici (ogni 20 gg) o chimici autorizzati (ogni 30 gg). Non trattare prima dei temporali per evitare il dilavamento.



Comune di Lavis